

Keratokonus korneanın incelme ve koni şeklinde tümsekleşmesi ile karakterize olan aşamalı bir bozukluktur. Erken evrelerinde keratokonus hafif bulanıklık, görme bozukluğu, parıltı ve ışığa karşı artmış hassasiyet ile karşımıza çıkar. Belirtiler ergenlik çağı sonlarında ve 20li yaşların başlarında görülür. Keratokonus 10-20 yıl boyunca ilerleme gösterip, daha sonra bu gelişimin yavaşlamaya başladığı görülür. Sonuç olarak, gözlüklerle belirgin görmenin ciddi anlamda azaldığı saptanır. Hafif şiddetteki vakalarda sabit kontakt lens kullanımı esas tedavi yöntemidir. Korneanın şiddetli bir şekilde dikleşmesi ve/veya korneal yaralanma ile karakterize olan ileri vakalarda ise korneal transplantasyon yapılması uygundur. İNTACS olarak adlandırılan yeni bir teknoloji ile orta ve ileri derecedeki keratokonus'un tedavisi daha rahat yapılabilmektedir.

### **İşaret ve semptomlar**

İlerleyen bulanıklaşma ve görmede bozukluk, parıltı ve ışığa karşı artmış hassasiyet.

### **Tedavi**

Gözlük, İNTACS

Kontakt lens kullanımı

Korneal transplantasyon